




13104114

**接種費用
無料**
全額公費

新型コロナワクチン 追加(3回目)接種のお知らせ



2022年3月

12~17歳の方も 3回目接種を受けられるようになりました

◎**接種の対象** 新しく接種の対象になるのは、2回目のワクチン接種を終了した12歳以上の方です。

12~17歳の方のうち、
基礎疾患がある方などの「**重症化リスクが高い方**」は
特に接種をおすすめしています。

接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

※重症化リスクが高い
具体的な基礎疾患に
ついては、厚生労働
省「新型コロナワク
チンQ&A」をご観
ください。



◎使用するワクチン

12~17歳の方は、ファイザー社のワクチンを使用します。1・2回目の接種量と同じ量を接種します。

18歳以上の方に用いているものと同じワクチンです。

※1・2回目に武田/モデルナ社ワクチンを受けた方も、ファイザー社ワクチンを受けられます。

新型コロナワクチンの 効果

- 1・2回目接種後、ワクチンの効果は時間の経過とともに低下していきませんが、同じワクチンを用いている18歳以上では、3回目の接種を行うことにより、オミクロン株に対する発症予防効果や入院予防効果が回復すると報告されています。

出典：UKHSA. Technical briefing 34. Jan 2022
UKHSA. COVID-19 vaccine surveillance report: 3 Feb 2022

- 16~17歳の場合では、オミクロン株流行期において、ワクチンの2回目接種後(14-149日経過後)は、新型コロナ感染症の様な症状のための救急外来の受診を34%減少させ、ワクチンの3回目接種後(7日以上経過後)は、同様の救急外来の受診を81%減少させる効果があったと報告されています。

出典：MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71(9): 352-358

新型コロナワクチンの 安全性

米国では、12~17歳に対する3回目の接種後7日以内の副反応は、2回目の接種後と同様の症状が、同じ程度かやや高い頻度で現れると報告されています。

■ 12-17歳の接種後7日間に現れた症状

報告割合	接種後の症状(2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛(76.0→80.0%)、疲労(58.7→58.5%)、頭痛(56.0→55.9%)
10-50%	筋肉痛(40.9→46.2%)、発熱(38.3→35.5%)、悪寒(27.8→32.6%)、関節痛(16.9→19.7%)、悪心(18.8→18.9%)、腫脹(14.1→18.8%)、発赤(8.4→10.2%)
1-10%	腹痛(9.3→8.5%)、そう痒(7.3→7.4%)、下痢(4.5→3.5%)、嘔吐(2.7→2.3%)、発疹(1.5→1.2%)

(※)登録数：3,418例(うち12-15歳：1,952例、16-17歳：1,466例)、報告期間：2021年12月9日~2022年2月20日

ごくまれですが、心筋炎を発症した例が報告されています。

出典：MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71(9): 347-351

米国では、3回目接種後の方が2回目接種後よりも心筋炎の報告頻度は低いとされています。

出典：MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71(9): 347-351

ワクチンを受けた後、数日以内に、胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

◎住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → **医療機関や施設でご相談ください。**
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → **医療機関でご相談ください。**
- ・お住まいが住所地と異なる方 → **実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。**
実際にお住まいの市区町村ホームページでご確認いただくか、相談窓口にお問い合わせください。

◎ワクチンを受けるにはご本人または保護者（※）の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

※16歳以上の方はご本人の同意に基づき接種が行われます。

12~15歳の方は保護者の同意に基づき接種が行われます。予診票に保護者の署名がなければ予防接種は受けられません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。


予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、区コールセンターにご相談ください。


◎ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いいたします。具体的には、「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。

感染予防対策を 継続していただく ようお願いします。						
	密集場所	密接場面	密閉空間	マスクの着用	石けんによる 手洗い	手指消毒用アルコール による消毒の励行

「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報 については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。	厚労 コロナ ワクチン	検索	
---	-------------	----	---

厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター 0120(761)770 9時から21時まで 土日祝含む	東京都新型コロナウイルス ワクチン副反応相談センター 03(6258)5802 24時間対応 土日祝含む	新宿区新型コロナウイルス ワクチン接種コールセンター 03(4333)8907 0570(012)440 *ナビダイヤル 8時30分から19時まで 土日祝含む
コロナワクチン接種全般についてのご意見・お問い合わせ	ワクチン接種後の副反応についてのお問い合わせ	その他各種お問い合わせ <ul style="list-style-type: none">・集団接種会場の予約をしたい・どこの医療機関で接種可能か・接種券を紛失したがどうしたら良いか等

詳しくは新宿区ホームページをご確認ください。ワクチン接種に関するご予約・お問い合わせは下記コールセンターまで
Please check the Shinjuku City website for details. To make your COVID-19 vaccination appointment, or to ask questions about the vaccination, please contact the call center below.

详细内容请到新宿区官网确认。有关疫苗接种的预约・问询，请联系咨询电话。

자세한 내용은 신주쿠구 홈페이지를 참조하십시오. 백신 접종에 관한 예약 및 문의는 아래 콜 센터로.

↓

Call center / 咨询电话 / 콜센터 ☎ **03(4333)8907** 0570(012)440 *ナビダイヤル (聴覚に障害のある方等向け) **FAX 050(3852)1343**